？少散患者全出现颜面潮红、眼睑水肿、皮疹及喘息急保等过敏反应，需考虑其系也压下降或过敏性休克。

5.本品含红细胞凝集素（抗A、抗B），A、B型血型患者大量输注时，偶可发溶血。

6.患有抗第四大凝血因子抗体的血友病患者对凝血酶原复合物反应不佳。

接受外科手术时应权衡利弊，慎用本品。

【禁忌】

人凝血酶原复合物

注射用人凝血酶原复合物

注射用人凝血酶原复合物说明书注意事项注意事项

Human Prothrombin Complex

【药品名称】

通用名称：人凝血酶原复合物

英文名称：Human Prothrombin Complex

汉语拼音：Ren Ningxuemeiyuan Guhewu

【成分】

本品活性成分为人凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ。本品系由健康人血浆，经凝胶吸附法分离纯化，并经S/D法和60℃30分钟水浴加热法灭活病毒处理，冻干制成。

辅料：枸橼酸钠、甘氨酸、氯化钠、氯化钙和蔗糖。

【性状】

本品为白色或浅绿色疏松体，复溶后为无色、澄清、液态白或黄绿色透明溶液，可带轻微乳光。

【适应症】

本品用于获得性或先天性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症伴出血或有出血倾向的情况

例如凝血因子Ⅸ缺乏症（B型血友病）、以及Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ凝血因子缺乏症。

【老年用药】

2.临床研究证实，老年患者对本品反应与其他年龄组患者无明显差异。

【禁忌】

1.已知对本品成分或其他血液制品过敏者。

2.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

3.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

4.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

5.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

6.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

7.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

8.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

9.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

10.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

11.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

12.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

13.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

14.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

15.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

16.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

17.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

18.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

19.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

20.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

21.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

22.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

23.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

24.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

25.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

26.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

27.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

28.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

29.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

30.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

31.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

32.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

33.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

34.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

35.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

36.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

37.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

38.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

39.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

40.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。

41.患有肝素诱导性血小板减少症（HIT）或有HIT史者。